



Wandel der kognitiven Gesundheit

Was 324 Gesundheitsfachkräfte über Prävention, KI und die Zukunft der Versorgung der Gehirngesundheit berichten

Die verborgene Botschaft der Befragung

Kognitive Untersuchungen entwickeln sich von einer späten, punktuellen Prüfung zu einem früheren, wiederholten und besser integrierten Bestandteil der Versorgung.

324

Fachkräfte

43

Länder

Juni-Juli

2026

SO LESEN SIE DIE DATEN

Sechs Signale der Befragung, auf die Fachkräfte jetzt reagieren können.

Der Wert der Befragung liegt nicht nur in den Prozentangaben, sondern in dem praxisnahen Muster, das sie für die Versorgung ergeben.

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 01 | Früher beginnen | Kurze kognitive Ausgangserhebungen nutzen, bevor Symptome zum einzigen Auslöser werden. |
| 02 | Veränderungen beobachten | Fortschritte alle paar Monate oder bei klinischer Begründung kontinuierlich verfolgen. |
| 03 | Risikomomente beachten | Kognitive Kontrollen bei Medikamentenänderungen, Anästhesie und Operationen einplanen. |
| 04 | Anamnese erweitern | Kognition bei psychischer Gesundheit, Entwicklung, Altern und Rehabilitation berücksichtigen. |
| 05 | Vertrauen erhalten | Digitale Tools zur Entlastung nutzen, die klinische Beurteilung jedoch transparent halten. |
| 06 | Hürden abbauen | Kosten, Erstattung, Bekanntheit und Einbindung in Arbeitsabläufe vor Ort angehen. |

PRAKTISCHER RAHMEN

Stellen Sie kognitive Versorgung nicht als weiteren Test dar. Vermitteln Sie sie als Möglichkeit, einen Ausgangswert zu erheben, Veränderungen zu beobachten und bessere Gespräche zu führen.

EINBLICK 01 · AUSGANGSWERTE

Die Befragung spricht für frühere kognitive Ausgangserhebungen – nicht für wahllose Diagnostik.

Nur eine sehr kleine Minderheit befürwortete ein Abwarten bis zum Auftreten von Symptomen. Die praktische Chance liegt in routinemäßigen Ausgangserhebungen mit klaren Regeln für die Verlaufskontrolle.

11%

Sagen, Kontrollen sollten erst bei auftretenden Symptomen beginnen

61%

Sagen, Routinekontrollen sollten spätestens mit 50 Jahren beginnen

78%

Stimmen zu, dass Erwachsene ab 60 jährlich kognitiv untersucht werden sollten

Praktisches Protokoll für eine Praxis

- 01** Bei der Aufnahme einen Ausgangswert erheben, wenn kognitive Beschwerden, psychische Symptome, Lernprobleme, Sorgen zum Altern oder Rehabilitationsbedarf bestehen.
- 02** Bei Erwachsenen ab 50 auch ohne Symptome eine kurze kognitive Ausgangserhebung erwägen, besonders bei Risikofaktoren oder familiärer Sorge.
- 03** Bei Erwachsenen ab 60 jährliche oder regelmäßige Kontrollen als Verlaufsmaß nutzen, nicht als alleinige Diagnose.
- 04** Ergebnisse als Profil und Ausgangspunkt für die Verlaufskontrolle erklären; bei Abbau, Unstimmigkeiten oder funktioneller Beeinträchtigung zur vertieften Abklärung überweisen.

KLINISCHE SCHUTZVORKEHRUNG

Die wirksamste Prävention bedeutet nicht, Menschen frühzeitig zu etikettieren. Entscheidend ist zu wissen, was sich wann verändert hat und ob dies funktionell relevant ist.

EINBLICK 02 · RISIKOMOMENTE

Die Kognition sollte überwacht werden, wenn die Behandlung selbst sie beeinträchtigen kann.

Die Befragung zeigt einen praktischen blinden Fleck: kognitive Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Medikamenten, Anästhesie und Operationen.

80%

Stimmen zu, dass Fachkräfte kognitive Nebenwirkungen systematisch überwachen sollten

69%

Sind optimistisch für die nächsten fünf Jahre der kognitiven Versorgung

93%

Sagen, Organisationen sollten mehr für Gehirn- und psychische Gesundheit tun

Eine dreistufige kognitive Sicherheitsschleife

Vorher

Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Verarbeitungsgeschwindigkeit oder vom Patienten berichtete kognitive Beschwerden vor einem bekannten Risikomoment dokumentieren.

Nachher

Nach Medikamentenänderungen, Anästhesie, Operationen oder anderen Eingriffen kurz nachkontrollieren, wenn kognitive Beschwerden plausibel sind.

Handeln

Berichten Patient oder Familie eine Veränderung, mit dem Ausgangswert vergleichen, Medikation prüfen und bei anhaltender funktioneller Beeinträchtigung oder Verschlechterung überweisen.

PRAKTISCHER EINBLICK

Kognitive Versorgung lässt sich möglicherweise dort am einfachsten integrieren, wo Risiken bereits überwacht werden: bei Medikationsprüfungen, Nachsorge und Rehabilitationsmeilensteinen.

EINBLICK 03 · SPEKTRUM

Kognitive Gesundheit wird zur Querschnittsaufgabe der Versorgung.

Die Befragten betrachten Kognition nicht nur im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen. Ihre Fälle umfassen Entwicklung, emotionale Gesundheit, Altern, Leistungsfähigkeit und Rehabilitation.

73%

Sehen die Zukunft als übergreifend oder zentral für psychische Gesundheit und Wohlbefinden

35%

Der Nennungen betreffen Entwicklungsbedarfe

22%

Der Nennungen betreffen emotionale Gesundheit

Kognition als Perspektive bei der Aufnahme nutzen

Entwicklung	Aufmerksamkeit, Lernschwierigkeiten, Autismus, schulische Leistung.
Emotionale Gesundheit	Depression, Angst, affektive Störungen, Fatigue, Konzentrationsbeschwerden.
Gehirnalterung	Gesundes Altern, leichte kognitive Beeinträchtigung, Demenzrisiko, familiäre Sorgen.
Rehabilitation	Hirnverletzung, Schlaganfall, Meilensteine der funktionellen Erholung.
Leistungsfähigkeit	Berufliche Anforderungen, kognitive Optimierung, sicherheitskritische Tätigkeiten.

PRAKTISCHER EINBLICK

Eine kognitive Frage lässt sich in viele Aufnahmegespräche einbauen: Welche Veränderung bemerkt der Patient, welche Funktion ist betroffen und mit welchem Ausgangswert können wir später vergleichen?

EINBLICK 04 · VERLAUF

Eine Einzelmessung ist wenig aussagekräftig. Veränderungen im Zeitverlauf sind klinisch nützlich.

Die Befragung deutet darauf hin, dass sich das Feld bereits zur wiederholten Verlaufsbeobachtung bewegt, mit einem erheblichen Anteil zu Hause.

63%

Kontrollieren alle paar Monate oder kontinuierlich

35%

Sagen, die Nutzung erfolgt am häufigsten zu Hause

41%

Sagen, die Nutzung erfolgt am häufigsten in der Praxis

Empfohlener Rhythmus der Verlaufskontrolle

Ausgangswert

Bei Aufnahme, jährlicher Vorsorge, Beginn einer Intervention oder vor einem behandlungsbedingten Risikomoment.

Alle paar Monate

Während Training, Rehabilitation oder Therapieanpassungen.

Kontinuierliches digitales Monitoring

Für Adhärenz, frühe Signale oder Coaching – bedeutsame Veränderungen jedoch klinisch bestätigen.

Eskalation

Bei wiederholtem, funktionell relevantem oder unerwartetem Abbau sowie bei Berichten von Familie oder Betreuungsperson.

PRAKTISCHER EINBLICK

Ein Hybridmodell kann die Praxis für die Interpretation und das Zuhause für wiederholte Messungen, Adhärenz und Patienteneinbindung nutzen.

EINBLICK 05 · VERTRAUEN

Automatisierung dort einsetzen, wo Fachkräfte bereits Vertrauen zeigen – und dort langsamer vorgehen, wo es sinkt.

Das Muster ist kein pauschales Ja oder Nein. Bei administrativen und analytischen Anwendungen ist das Vertrauen höher als bei klinischer Entscheidungsunterstützung oder Patienteneinbindung.



Praktische Schutzregeln

- 01 Automatisierung zuerst für Entwürfe, Zusammenfassungen, Berichte und strukturierte Empfehlungen einsetzen, die eine Fachkraft prüft.
- 02 Dokumentieren, ob eine Empfehlung klinisch bestätigt oder vom Tool erzeugt wurde.
- 03 Bei klinischen Entscheidungen und Patienteneinbindung klare Verantwortung, Einwilligung, Datenschutz und Eskalationswege verlangen.

EINBLICK 06 · EVIDENZ

Innovationsprioritäten sind evidenzstatt funktionsgeleitet.

Fachkräfte setzen Validierung, Personalisierung und Ergebnismessung an die Spitze der Entwicklungsagenda.





PRAKTISCHER EINBLICK

Fragen Sie bei der Auswahl einer Plattform für kognitive Versorgung zuerst: Was ist validiert, welches Ergebnis wird gemessen, wie passt sie in den Arbeitsablauf und wie erklären wir Patienten die Ergebnisse?

EINBLICK 07 · EINFÜHRUNG

Die Hürde liegt weniger in der Überzeugung als im Zugang.

Kosten sind die größte Hürde. Fehlende Bekanntheit und Erstattung werden ebenfalls häufiger genannt als mangelnde klinische Validierung.



Lokale Maßnahmen für eine Praxis

- 01** Eine kostengünstige Ausgangserhebung anbieten und vertiefte Assessments für Risiko, Veränderung oder funktionelle Beeinträchtigung reservieren.
- 02** Das Team darin schulen, kognitives Monitoring in weniger als einer Minute verständlich zu erklären.

PRAXISPLAN

Ein 30-Tage-Ablauf, den Gesundheitsfachkräfte tatsächlich umsetzen können.

Ein einfacher Weg, die Signale der Befragung in die Praxis zu übertragen, ohne klinische Abläufe unnötig zu verkomplizieren.

Woche 1**Festlegen, wer einen Ausgangswert erhält**

Erwachsene ab 50 und ab 60, kognitive Beschwerden, Fälle aus der psychischen Gesundheit, medikamenten- oder eingriffsbezogene Risikomomente, Rehabilitationspatienten und Überweisungen wegen Lernen oder Entwicklung.

Woche 2**Minimalen Datensatz auswählen**

Kurzes kognitives Profil, vom Patienten berichtete Beschwerden, funktionelle Auswirkungen, Risikofaktoren und ein klarer Vermerk zum Nachkontrollbedarf.

Woche 3**Rhythmus der Nachkontrollen festlegen**

Bei aktiven Fällen alle paar Monate; bei altersbezogenen Ausgangswerten jährlich oder regelmäßig; früher nach medikamenten- oder eingriffsbezogenen Beschwerden.

Woche 4**Prüfen und verbessern**

Abschluss, Patientenverständnis, Überweisungen, Zeitaufwand und Auswirkungen der Ergebnisse auf Versorgungsentscheidungen verfolgen.

PRAKTISCHER EINBLICK

Beginnen Sie mit einem Versorgungspfad und einer Zielgruppe. Der Ausbau kognitiver Versorgung scheitert meist, wenn der erste Arbeitsablauf zu ehrgeizig ist.

PRAXISGERECHTE SPRACHE

Kognitives Monitoring erklären, ohne Angst auszulösen.

Die Befragung unterstützt frühere Verlaufskontrollen; die klinische Kommunikation sollte normale Schwankungen jedoch nicht übermäßig medikalisieren.

Für einen Patienten Wir möchten Sie nicht anhand eines einzelnen Werts etikettieren. Wir erheben einen kognitiven Ausgangswert, um Veränderungen im Zeitverlauf zu verstehen.

Für ein Familienmitglied Ein Einzelergebnis ist weniger hilfreich als ein Verlauf. Sagen Sie uns, was sich im Alltag verändert hat, wann es begann und ob es besser oder schlechter wird.

Für den überweisenden Behandler Dies ist ein strukturiertes kognitives Profil zur Unterstützung von Monitoring und Triage. Es ersetzt keine diagnostische Abklärung, wenn Symptome oder funktioneller Abbau dies erfordern.

Für einen Kostenträger oder Verwalter Die Befragung deutet darauf hin, dass vor allem Kosten, Erstattung und Bekanntheit die Einführung begrenzen. Ein kurzer Pfad zur Ausgangserhebung kann Hürden senken, bevor eine komplexere Abklärung nötig wird.

KOMMUNIKATIONSREGEL

Verwenden Sie häufiger Ausgangswert, Verlauf und Funktion als Messwert, Beeinträchtigung oder Risiko.

Die Chance liegt nicht in mehr Tests. Es geht darum, Kognition früher sichtbar zu machen, sie im Verlauf zu beobachten und auf Veränderungen zu reagieren.

FRÜHER Nicht warten, bis Symptome der einzige Auslöser sind.

WIEDERHOLT Verläufe nutzen, um Rauschen von bedeutsamen Veränderungen zu trennen.

ÜBERGREIFEND Kognitive Fragen in psychischer Gesundheit, Altern, Entwicklung und Rehabilitation stellen.

EVIDENZGELEITET Validierte Tools, messbare Ergebnisse und klare Interpretation priorisieren.

ZUGÄNGLICH Hürden bei Kosten, Erstattung, Bekanntheit und Arbeitsabläufen abbauen.

Kognitive Gesundheit könnte zu einem neuen „Vitalzeichen“ werden – wenn sie für die Versorgung praxistauglich genug ist.



<https://www.cognifit.com/de/medical-platform>